

HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA FOCAL

Bárbara Augusta Paulino FERREIRA¹

Letícia Schippa MIGUEL²

Gabriela Oliveira SALOMÃO³

Eni Vaz Franco Lima de CASTRO⁴

Alvimar Lima de CASTRO⁵

Henrique José Baldo de TOLEDO⁶

RESUMO

A Hiperplasia Fibrosa Inflamatória (HFI) constitui-se como lesão proliferativa não neoplásica benigna, surgida na cavidade bucal a partir de um traumatismo crônico de baixa intensidade, comum em usuários de prótese total. Apresenta-se como um aumento volumétrico nodular com forma e tamanho variado, base de implantação pediculada ou sésil. A Hiperplasia Fibrosa Inflamatória Focal é comum na mucosa jugal, língua e lábio inferior, causada por trauma onde nem sempre a irritação é determinada. Apresenta consistência firme e coloração semelhante ao tecido normal, sendo geralmente assintomática. Estas características podem variar dependendo da intensidade da irritação ou do tempo de evolução da lesão. Acomete mais frequentemente na idade adulta entre a quarta e quinta década de vida, com predileção pelo sexo feminino e raça branca. O primeiro passo para o tratamento é afastar o fator etiológico seguido da remoção cirúrgica. CASO CLÍNICO: Paciente sexo masculino, 63 anos, raça branca com presença de nódulo, na mucosa labial superior esquerda, forma arredondada, único, cor esbranquiçada, limites nítidos, superfície rugosa, base sésil, consistência fibrosa. Foi realizada biópsia excisional com resultado histopatológico de hiperplasia fibrosa inflamatória com prognóstico favorável.

Palavras-chave: Lesão bucal. Hiperplasia Fibrosa Inflamatória.

¹ barbara-paulino@hotmail.com

² letícia_schippa@hotmail.com

³ gabriela-salomao@hotmail.com

⁴ enicastro@terra.com.br

⁵ alvimar@foa.unesp.br

⁶ henriquejbtolledo@ig.com.br