

## CISTO PERIAPICAL

Nathalia Regina MALVESSI<sup>1</sup>  
Vanessa Sabryne Wesolowski PORTO<sup>2</sup>  
Eni Vaz Franco Lima de CASTRO<sup>3</sup>  
Henrique José Baldo de TOLEDO<sup>4</sup>  
Alvimar Lima de CASTRO<sup>5</sup>

### RESUMO

O cisto periapical, também conhecido como Cisto Radicular Apical, trata de uma lesão óssea integrante do grupo de Cistos Odontogênicos Inflamatórios. No mundo, cerca de 86% das ocorrências de cisto em regiões maxilofaciais, são casos de periapicais inflamatórios. O diagnóstico se dá através da realização de exame clínico, radiográfico e histopatológico. Devem ser observados fatores como localização, tamanho e forma da lesão. A terapêutica consiste normalmente no tratamento endodôntico dos elementos dentais envolvidos e a enucleação do cisto cirurgicamente quando não houver regressão espontânea após tratamento endodôntico. CASO CLÍNICO: Paciente do gênero masculino, 36 anos, apresentava um nódulo exofítico arredondado localizado na região de gengiva vestibular acima do 24, tamanho aproximado de 3 cm, cor arroxeada, limites nítidos, superfície lisa e brilhante, base larga e consistência flácida. Ao exame radiográfico, notava-se perda óssea periodontal severa na região do 24. Foi realizada biópsia excisional que teve como resultado Lesão Cística Periapical.

Palavras-chave: Cisto periapical. Cisto radicular apical.

---

<sup>1</sup> nathalia.malvessi@hotmail.com

<sup>2</sup> vaah\_15@hotmail.com

<sup>3</sup> eni@vivax.com.br

<sup>4</sup> henriquejbtoledo@ig.com.br

<sup>5</sup> alvimar@foa.unesp.br