

NÍVEL DEPRESSIVO DE ALCOOLISTAS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD

Gabriela Barbosa Queiros SANTOS*
Rhayanna Gomes Magalhães PEREIRA**
Thiago Henrique Muniz MORILHA***

RESUMO

O uso abusivo do álcool pode ocasionar dependência e trazer sérios danos à vida biopsicossocial dos indivíduos. As alterações químicas causadas no cérebro fazem com que seja considerada uma droga depressora, instalando, em alguns casos, a depressão, que se torna uma comorbidade no alcoolista. Em razão disso, este estudo objetiva investigar o nível depressivo apresentado por alcoolistas em recuperação que frequentam o grupo de apoio do CAPS-AD (atendimento aos usuários de drogas lícitas e ilícitas) do interior Paulista. Trata-se de uma pesquisa de campo, com delineamento transversal de caráter descritivo. Os instrumentos utilizados nesse trabalho são: Teste para Identificação de Problemas Relacionados ao Uso de Álcool - AUDIT e Inventário de Depressão de Beck - BDI-II. Após a aplicação, os dados foram organizados e quantificados para análise dos resultados e discussão. O resultado obtido pela população no protocolo BDI-II foi de 40% nível mínimo, 0% nível leve, nível moderado atingiu 20% e por último o nível grave com 40%. No protocolo AUDIT 6,7% atingiram o consumo de baixo risco, uso de risco 0,0%, uso nocivo e a provável dependência atingiram 46,7% ambos. Conclui-se que o nível depressivo em alcoolistas participantes do grupo de apoio é considerado médio, ou seja, é possível que em alguns casos o uso abusivo do álcool contribui para que se adquira a depressão como comorbidade.

Palavras-chave: Depressão. Alcoolistas. Centro de Atenção Psicossocial.

* Graduada em Psicologia, Centro Universitário de Santa Fé do Sul – SP, UNIFUNEC, gabriela_barbosa10@hotmail.com

** Graduada em Psicologia, Centro Universitário de Santa Fé do Sul – SP, UNIFUNEC, rhayanna_gomes@hotmail.com

*** Docente do Centro Universitário de Santa Fé do Sul – SP, UNIFUNEC, thiagomorilha3@yahoo.com.br