

HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA

YOSHIDA, Jony Rogério *

QUEIROZ, Rodrigo Lima **

BRITO, João Campos de ***

BRITO, Gleiciane Moura Sousa de ****

MARQUES, Bruno Vinícius *****

Orientador(a): TOLEDO, Henrique José Baldo de

Traumas mecânicos crônicos locais podem levar ao aparecimento de lesões bucais, caracterizada por aumento de volume tecidual de coloração normal, consistência fibrosa e geralmente assintomática. De maior frequência em pacientes do sexo feminino, podendo aparecer em qualquer área da boca, porém as regiões de fundo de sulco, palato e mucosa de rebordo alveolar são as mais comuns. Dentre os traumas crônicos locais, prótese mal adaptada, fraturada ou uso de maneira inadequada, fratura ou aresta dental são os principais. A remoção cirúrgica, com exame microscópico do tecido excisado é o tratamento de eleição, porém o fator causal deve ser removido, sendo o prognóstico favorável. CASO CLÍNICO: paciente do sexo feminino, leucoderma, 23 anos de idade com queixa de “caroço na língua” surgido aproximadamente há um ano em local onde fazia uso de piercing e relatou não ter feito nenhum tipo de tratamento. Ao exame físico observou-se nódulo no dorso lingual região anterior, pediculado, com tamanho aproximado de 1 centímetro, cor rosa, limites nítidos, superfície lisa, consistência borrachóide. No diagnóstico diferencial considerou-se Hiperplasia Fibrosa Inflamatória Focal e Fibroma. O tratamento realizado consistiu na biópsia excisional com prognóstico favorável. O diagnóstico definitivo confirmou Hiperplasia Fibroepitelial Inflamatório. O pós-operatório transcorreu dentro dos padrões de normalidade.

Palavras-chave: Hiperplasia Fibrosa.

* FUNEC, jry_001@hotmail.com

** FUNEC, rglima17@yahoo.com

*** FUNEC, jry_001@hotmail.com

**** FUNEC, jry_001@hotmail.com

***** FUNEC, brunoviniusmarques@bol.com.br