

SINDROME DE FOURNIER: A VIVENCIA DA ENFERMAGEM NA UTILIZAÇÃO DA CAMARA HIPERBARICA E PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DA FERIDA

FRIAS, Mariana *
FERREIRA, Márcia Cristina
Orientador(a): LIMA, Claudia Lucia de

Este trabalho tem como objetivo acompanhar a evolução e cicatrização de uma ferida ocasionada por Síndrome de Fournier, uma forma específica de gangrena, também conhecida como fascíte necrozante atingindo a derme, epiderme e tecido subcutâneo, de início súbito sem qualquer queixa, quando há febre já encontra-se em um quadro mais grave, com rápida progressão para necrose, podendo evoluir para choque séptico, e falência múltipla dos órgãos, com elevado índice de mortalidade, sendo uma infecção mista, podendo ser combinada de bactérias anaeróbicas, ocorre na região abdominal, escrotal, perianal e membros inferiores. A utilização da Câmara Hiperbárica no auxílio do processo cicatrização da Síndrome de Fournier tem obtido bons resultados utilizando oxigenoterapia hiperbárica com tratamento inicial com 2 sessões diárias de 120 minutos; trata-se de um relato de caso clínico em uma cliente do sexo feminino de 48 anos, desenvolvido no Hospital Regional de Ilha Solteira, Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, sendo discutidos os aspectos cicatriciais da ferida. Foram realizadas sessões de Câmara Hiperbárica, curativos diários realizados por estagiários e supervisionados por enfermeiros docentes, e mensuração com régua e fotografia. Conclui-se que clientes submetidos a tratamento com a câmara hiperbárica tem tido bons resultados no processo de cicatrização, assim como a ausência de patologia de base, pouca idade, auto estima e trabalho em equipe contribuíram de forma significativa para o resultado satisfatório deste processo.

Palavras-chave: Síndrome Fournier. Câmara hiperbárica.

* FUNEC