

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA ANGINA DE LUDWIG: RELATO DE CASO CLÍNICO

Edinelly da Silva SANDRI*
Eloisa Matos de OLIVEIRA**
Mariany Lacerda RODRIGUES***
Kaila Barbosa da Silva FEITOSA****
Eduardo Francisco de Souza FACO*****
Flávia Priscila PEREIRA*****

RESUMO

A angina de Ludwig é uma celulite frequentemente originada de uma infecção odontogênica classicamente localizada no segundo e terceiro molares inferiores, que envolve os espaços submandibular, sublingual e submentoniano. Os Sintomas são: febre alta, sensação de língua elevada, inchaço na região da mandíbula e do pescoço, dificuldade para engolir e comer, dificuldade para abrir a boca, sensação de sufocamento, dificuldade para respirar, aumento na produção de saliva, inflamação na garganta, dor na boca ou dor de garganta. Os fatores de risco são pacientes imunossuprimidos, diabéticos, anêmicos e pessoas com doenças renais ou que fazem o uso em excesso de bebidas alcoólicas e piercing na língua. O tratamento é em nível hospitalar com manutenção das vias aéreas, incisão e drenagem, antibioticoterapia e eliminação do foco infeccioso original. A antibioticoterapia endovenosa pode ser a base de Penicilina G, podendo-se associar com Metronidazol. Este trabalho é um relato de caso clínico que tem como objetivo apresentar o tratamento de um paciente com evolução de um abscesso de origem odontogênica para a Angina de Ludwig, tratamento este, citado amplamente na literatura pertinente. O paciente compareceu ao pronto socorro da santa casa de Araçatuba com febre, dor na região bucal, edema e vermelhidão na região submandibular e submentoniana. Após a indução anestésica foi administrado antibiótico pela via endovenosa (Ceftriaxona 1g), sendo então extraído o dente envolvido, drenagem da coleção purulenta nos espaços faciais submandibulares e colocação de drenos extra-orais. Depois de 24 horas foi observada a melhora geral do paciente com a manutenção da antibioticoterapia por 7 dias. Concluímos que o diagnóstico do quadro de Angina de Ludwig deve ser de conhecimento amplo na classe odontológico, para que o mesmo seja feito o mais precocemente possível, determinando um pronto atendimento, reduzindo a morbidade e mortalidade dos pacientes que apresentam esta patologia.

Palavras-chave: Angina de Ludwig. Abscesso odontogênico.

* Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa fé do Sul, SP – Unifunec. edvania.silva_50@hotmail.com

** Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa fé do Sul, SP – Unifunec. eloisamatodeoliveira173@hotmail.com

*** Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa fé do Sul, SP – Unifunec. mariany_lacerd@hotmail.com

**** Discente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa fé do Sul, SP – Unifunec. kaila_f18@hotmail.com

***** Docente do Centro Universitário de Santa fé do Sul, SP – Unifunec. efsfaco@gmail.com

***** Orientadora. Docente do Centro Universitário de Santa fé do Sul, SP – Unifunec. fppereira@hotmail.com