INDICAÇÕES DOS ANESTÉSICOS LOCAIS PARA PACIENTES COM COMPROMETIMENTO SISTÊMICO

Ana Clara Ribeiro dos SANTOS*
Eleandra de F. CALIXTO**
Emanuelly Sanches GOMES***
Gabrielly Souza GOMES****
William Eduardo PIROLA*****
Rafael Biani VIVALDINI******
Flávia Priscila PEREIRA*******

RESUMO

Introdução: A utilização de anestésicos locais em odontologia é crucial não apenas para o conforto do paciente, mas também para o sucesso do tratamento. Além do propósito de promover analgesia, a anestesia local permite que procedimentos mais invasivos, como extrações dentárias ou tratamentos de canal, sejam realizados de forma segura e eficiente. Entretanto, apesar de sua ampla utilização, os anestésicos locais não estão isentos de possíveis complicações. Alguns pacientes podem apresentar reações alérgicas, o que pode resultar em sintomas como inchaço, coceira e dificuldade respiratória. Além disso, é importante ressaltar que a administração inadequada ou excessiva de anestésicos pode causar efeitos colaterais indesejáveis, como alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial. **Objetivo:** Apresentar a importância do conhecimento abrangente sobre a indicação dos diferentes anestésicos locais e sua influência em pessoas com comprometimento sistêmico, conscientizando os profissionais sobre os possíveis grupos de risco, tais como; distúrbios renais, hepáticos, cardiovasculares, gestantes, lactantes e drogadicto. **Metodologia:** Foi realizada uma revisão de literatura, buscando-se artigos nas bases de dados científicas como Pubmed, Google Acadêmico e livros textos, relacionadas ao tema estudado que se refere à influência dos anestésicos locais durante os tratamentos odontológicos em pacientes com comprometimento sistêmico. **Resultado:** Para a correta seleção do anestésico local para pacientes com comprometimento sistêmico, é importante que além dos aspectos da anamnese (medicamentos em uso, controle da doença, etc) deve-se considerar o o tipo e tempo do procedimento a ser realizado, considerando-se aspectos da metabolização e excreção desses fármacos. **Conclusão:** Os anestésicos locais podem ser usados com segurança em pacientes com comprometimento sistêmico, como hipertensos, diabéticos, gestantes e hepatopatas, desde que as precauções adequadas sejam tomadas. É essencial que os profissionais de odontologia avaliem cuidadosamente cada caso individualmente por meio de uma anamnese minuciosa e tomem medidas para minimizar qualquer risco potencial.

Palavras-chave: Diabetes. Hipertensos. Gestantes. Anestésicos local.

* Discente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec, anaclaranx12@gmail.com
** Discente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec, eleandra_calixto15@icloud.com
*** Discente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec, emanuellyfigueiredo@icloud.com
**** Discente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec, gabysouzag@hotmail.com
***** Docente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec, wepirola@gmail.com
****** Docente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec, rafael_biani@hotmail.com
******* Docente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec, flaviappereira@hotmail.com