

REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO GENGIVAL ATRAVÉS DO AUMENTO DE COROA CLÍNICA

Bárbara Karen Oliveira FREITAS*
Dyego Bife Guimarães da SILVA **
Pablo Pádua BARBOSA ***

RESUMO

Introdução: A estética do sorriso é amplamente determinada pela forma e posição dos dentes, pela posição dos lábios e altura do tecido gengival. Aproximadamente 10,57% da população apresenta exposição gengival exagerada durante o sorriso e fala. Entre os fatores etiológicos, destacam-se o excesso de placa bacteriana, o crescimento vertical excessivo da maxila, a erupção passiva alterada (EPA) e hiperatividade labial. Diferente da erupção dentária normal, a EPA resulta na persistência de tecido mole sobre a superfície do esmalte, levando à exposição excessiva do tecido gengival na parte anterior da maxila durante o sorriso. Essa condição compromete a estética do sorriso, gerando um resultado visual inadequado. Em casos como esse, intervenção cirúrgica periodontal é essencial para um resultado estético satisfatório, por isso, a compreensão e tratamento eficaz dessa condição são indispensáveis ao cirurgião dentista. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é analisar o tratamento do "sorriso gengival" em casos relacionados com coroas clínicas encurtadas, com ênfase na remoção de tecido ósseo, seja insuficiente ou exagerada, e suas consequências clínicas. O estudo mostra as implicações da remoção inadequada de tecido ósseo, incluindo recessão gengival ou reincidência da hiperplasia. **Metodologia:** Sendo uma revisão de literatura, foram analisados artigos publicados nos últimos 10 anos, em português e inglês, nas plataformas PubMed e Google Acadêmico. A busca foi feita utilizando os termos “aumento de coroa clínica com osteoplasia” “correção de sorriso gengival” “osteotomia” “crown lengthening”, “esthetic crown lengthening” e “coroa clínica encurtada” para a obtenção de estudos que atendam o objetivo do estudo. **Resultados:** Apesar de sua complexidade, o aumento de coroa clínica é eficaz na remoção do excesso de tecido gengival e exposição da coroa clínica. No entanto, uma execução cuidadosa aumenta significativamente a eficácia do procedimento e não reincidência. **Conclusão:** Uma abordagem organizada e multidisciplinar é essencial para alcançar resultados previsíveis e estáveis.

Palavras-chave: aumento de coroa clínica; coroa clínica encurtada; erupção passiva alterada; cirurgia periodontal.

* Discente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP - Unifunec. barbaraunifunec@gmail.com

** Discente do curso de odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec, dyego.bife@hotmail.com

*** Docente do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. pablocdpb@hotmail.com