

EMPREGO DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO-A PARA HARMONIZAÇÃO DA FACE: RELATO DE CASO CLÍNICO

Giulia Paggioro Carvalho de OLIVEIRA*

Isabella de Freitas DYNA**

Natália Pinatti MAENOSONO***

Rafael Massunari MAENOSONO****

RESUMO

Introdução: A Toxina Botulínica tipo A tem se destacado como uma das ferramentas mais relevantes dentro da harmonização facial, por sua eficácia no tratamento das linhas de expressão dinâmicas e na promoção de resultados estéticos naturais. Além de suavizar rugas e marcas faciais, seu uso controlado possibilita restaurar equilíbrio e simetria, contribuindo não apenas para a melhora da aparência, mas também para o bem-estar e a autoestima dos pacientes. Trata-se de um procedimento minimamente invasivo, com rápida execução e baixo índice de complicações quando corretamente indicado, o que contribui para sua ampla difusão na prática clínica contemporânea. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico que evidencia a aplicação da Toxina Botulínica tipo A em harmonização facial, destacando sua utilização como recurso seguro e eficaz na obtenção de resultados estéticos satisfatórios. **Metodologia:** Paciente do sexo feminino procurou atendimento odontológico com queixa sobre ríntides frontais e periorculares que determinavam um aspecto precocemente envelhecido à face. Após anamnese detalhada e exame clínico minucioso, foi proposto tratamento com toxina botulínica tipo A (Dysport®, Galderma). A aplicação foi realizada em consultório odontológico, respeitando protocolos de biossegurança e mapeamento individualizado da musculatura, totalizando 50 unidades distribuídas nas regiões do músculo frontal, orbicular do olho, prócero e corrugador. **Resultados:** Quinze dias após a aplicação, a paciente retornou para avaliação clínica, sendo observada melhora significativa nas ríntides dinâmicas relacionadas à hipertrofia muscular. Relatou também satisfação com o resultado estético, descrevendo maior naturalidade da expressão e ausência de dor, edema ou complicações nos dias subsequentes ao procedimento. **Conclusão:** Pode-se concluir que a utilização da Toxina Botulínica tipo A apresenta adequada segurança e eficácia no tratamento estético de ríntides faciais, configurando-se como uma opção previsível e confiável na harmonização facial quando aplicada com planejamento individualizado.

Palavras-chave: toxinas botulínica tipo A; técnicas cosméticas; expressão facial.

* Discente de Odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. dynaisabella@gmail.com

** Discente de Odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. giuliapaggioro@gmail.com

*** Cirurgiã-Dentista formada pelo Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. nathpinatti_sfs@hotmail.com

**** Orientador, Doutor, Docente do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. rafamaenosono@hotmail.com